

KONDYLOOMA

Kondylooman aiheuttaa ihmisen papilloomavirus (HPV). Valtaosa virustartunnoista on piileviä, vain osa tartunnan saaneista saa silmällä havaittavia muutoksia. Kondylooman itämisaika vaihtelee kuukausista vuosiin. Tartunnan tarkkaa ajankohtaa on mahdoton selvittää. Mitä useampi seksikumppani on ollut, sitä suurempi riski on saada kondylooma.

Oireet

- Kondyloomat ovat ihonvärisiä syylämäisiä muutoksia, joita todetaan naisilla yleisimmin ulkosynnyttimien alueella ja miehillä esinahan alla, peniksen varressa, virtsaputken suulla sekä peräaukon ympärillä.
- Kondylooma on useimmiten oireeton, mutta voi aiheuttaa kutinaa, punoitusta ja ihon rikkoutumista
- Kondylooma tarttuu useimmiten seksiteitse suorassa limakalvokontaktissa, ihon ja limakalvon muu samanaikainen tulehdus tai rikkoumat lisäävät tartuntariskiä.

Tutkimus ja hoito

- Kondylooma todetaan tyypillisten iho- ja limakalvomutosten perusteella
- Toistaiseksi ei ole olemassa testiä oireettomien taudinkantajien selville saamiseksi.
- HPV-tartunta voi aiheuttaa kohdunkaulaan solumuutoksia, jotka voidaan todeta irtosolunäytteessä (PAPA-näyte).
- Vain näkyviä kondyloomamuutoksia voidaan hoitaa.
- Kondyloomia hoidetaan kotona paikallishoidoilla (voiteet tai penslausliuokset) tai vastaanotolla jäädyttämällä ja laserilla.
- Elimistö sammuttaa virusinfektion keskimäärin 1-2 vuoden kuluessa.
- Vakituksessa suhteessa kondomin käytön ei ole todettu nopeuttavan paranemista. Tilapäisten seksikumppanien kanssa kondomia on käytettävä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.
- Kondomin antama suoja ei kuitenkaan ole täydellinen.