

Ohje päivitetty 13.5.2020

ALPROSTADIILI (esim. PROSTIVAS®)

Vaikuttava aine

Alprostadiili (prostaglandiini E1) on luonnollinen rasvahappo.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Alprostadiili laajentaa pieniä valtimoita ja laskimoita sekä estää verihutaleiden sakkautumista.

Lääkettä käytetään aikuisilla sidekudossairauksia sairastavilla potilailla ääreisverenkierron parantamiseen.

Annostus ja ottotapa

Annos on yleensä 60 µg. Alprostadiili annetaan sairaalassa tiputuksena laskimoon. Tiputus kestää noin neljä tuntia, ja sen aikana hoitaja seuraa verenpainetta ja pulssia. Hoitoa toistetaan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Haittavaikutukset

Lääke laajentaa verisuonia, joten voi vaikuttaa verenpaineeseen ja sydämen sykkeeseen ja se lisää pintaverenkiertoa, joten se voi aiheuttaa iho punoitusta.

Seuranta

Seuranta tapahtuu perustaudin lääkityksen vaatimalla tavalla.

Huomioitavaa

Tupakointi pahentaa ääreisverenkiertoa, joten potilaan on lopetettava tupakointi.