

Ohje päivitetty 13.5.2020

Bosentaani (Tracleer®)

Vaikuttava aine

Bosentaani on endoteliinireseptorin vastavaikuttaja.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Endoteliini on valkuaisaine, jota erittyä verisuonten sisäpintaa peittävästä soluista ja se on yksi voimakkaimmista verisuonia supistavista aineista. Bosentaanin vaikutuksesta verisuonivastus pienenee. Sen teho on pystytty osoittamaan sekä kohonneen keuhkovaltimopaineen (=pulmonaalihypertensio) että sormihaavaumien hoidossa tai uusiutumisen estossa sklerodermaa tai systeemisiä sidekudostauteja sairastavilla potilailla.

Annostus ja ottotapa

Aloitussuos on 62,5mg kaksi kertaa vuorokaudessa ja annos nostetaan yleensä annokseen 125mg kaksi kertaa vuorokaudessa. Ruoka ei vaikuta imeytymiseen. Tablettien ottamisen yhteydessä tulee juoda lasillinen vettä. Hoito on pitkäaikaista.

Haittavaikutukset

Lääkkeen käyttöön voi liittyä päänsärkyä. Sen lisäksi lääke saattaa aiheuttaa kasvojen punoitusta, kurkun- ja nenäkäytävien tulehdusta, säärien ja nilkkojen turvotusta, verenpaineen laskua, sydämen tykytystä, närästystä, väsymystä, kutinaa, pahoinvointia ja anemiaa. Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat oksentelu, ripuli, vatsakipu, ihottuma ja verihiutaleiden määrän lasku. Joskus voi ilmaantua silmien tai ihon keltaisuutta tai kuumeilua, johon liittyy pahoinvointia tai oksentelua. Tuolloin on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, sillä se saattaa liittyä maksan toiminnanhäiriöön.

Leikkaukset

Leikkausten yhteydessä lääkitystä ei tarvitse tauottaa.